



# MORTALIDAD POR VIH y SIDA EN ESPAÑA

**AÑO 2017. EVOLUCIÓN 1981-2017**

**Noviembre 2019**

**Citación sugerida:**

Unidad de vigilancia de VIH y conductas de riesgo. Mortalidad por VIH y sida en España, año 2017. Evolución 1981-2017. Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/ Plan Nacional sobre el Sida, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Madrid; 2019.

# Contenido

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>MATERIAL Y METODOS .....</b>	<b>5</b>
<b>RESULTADOS.....</b>	<b>5</b>
a) Mortalidad por VIH y sida en el año 2017.....	5
b) Evolución de la mortalidad por VIH y sida en el periodo 1981-2017.....	7
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>9</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>9</b>

## **MORTALIDAD POR VIH y SIDA EN ESPAÑA, AÑO 2017. EVOLUCIÓN 1981-2017**

### **INTRODUCCIÓN**

A pesar de que la supervivencia de los pacientes con infección por el VIH ha mejorado mucho tras la introducción de los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia, ésta sigue siendo una enfermedad grave que no tiene curación. La monitorización de las muertes por VIH y sida es un indicador para evaluar la efectividad de los tratamientos antirretrovirales y las actividades de prevención dirigidas a la lucha contra la infección por el VIH.

Una de las fuentes de información empleada para vigilar la mortalidad por VIH y sida es la Estadística de Mortalidad por Causas elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta fuente tiene cobertura nacional y se obtiene de forma similar en todas las comunidades autónomas. Como limitación está el retraso en su publicación.

Los ficheros de datos de defunciones, para codificar la Causa Básica de la Muerte, utilizan la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Durante el periodo 1981-1999 se produjeron diversos cambios en los criterios de clasificación que han afectado a las defunciones por VIH y sida. Inicialmente se utilizó la Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª revisión (CIE-9), en la cual no existían códigos específicos para la infección por VIH y sida, dado que en 1975 cuando se estableció esta clasificación, la infección por el VIH era una enfermedad desconocida; no fue hasta el año 1989 cuando se definieron códigos específicos para registrar las muertes por esta causa.

Por este motivo, hasta 1989 las defunciones por VIH y sida se registraban en el grupo 279 (Trastornos del mecanismo de la inmunidad) y sus códigos (279.1, 279.3, 279.8 y 279.9). A partir de 1989, se establece que las muertes por VIH y sida debían incluirse en uno de los siguientes códigos: 279.5 (sida), 279.6 (complejo relacionado con el sida) y 795.8 (infección por el VIH). Desde el año 1999 comienza a aplicarse la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª revisión (CIE-10), en la cual se han incluido códigos específicos para el VIH y sida (B20, B21, B22, B23, B24 y R75), por lo que a partir del 2000 sólo se tienen en cuenta dichos códigos para el cálculo de la mortalidad <sup>1</sup>.

En este informe se describe la mortalidad por VIH y sida en el año 2017 y su evolución durante el periodo 1981-2017.

## MATERIAL Y METODOS

Estudio descriptivo de la mortalidad por VIH y sida a partir de la estadística de mortalidad por causas, seleccionando los códigos específicos de VIH y sida para cada año. Para el cálculo de tasas se ha utilizado las poblaciones proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) <sup>2</sup>.

## RESULTADOS

### a) Mortalidad por VIH y sida en el año 2017

En el año 2017 se produjeron en España un total de 424.523 fallecimientos, de los cuales 442 (1,0 por 1.000) fueron por VIH y sida. De éstos, 342 (77,4 %) se produjeron en hombres y 100 (22,6 %) en mujeres. La tasa de mortalidad global por VIH y sida fue de 0,9 por 100.000 habitantes (tabla 1).

**Tabla 1. Defunciones totales, defunciones por VIH y sida, mortalidad proporcional por VIH y sida, y tasa de mortalidad VIH y sida por 100.000 habitantes total y por sexo. Año 2017**

	Defunciones totales	Defunciones por VIH y sida	Defunciones por VIH y sida (‰)	Tasa de mortalidad VIH y sida por 100.000 habitantes
<b>Hombres</b>	214.236	342	1,6	1,5
<b>Mujeres</b>	210.287	100	0,5	0,4
<b>Total</b>	424.523	442	1,0	0,9


La edad media de los fallecidos por VIH y sida fue de 53,2 años (DE: 11,2), siendo significativa la diferencia entre la edad media en hombres (54,1 años; DE: 11,3) y mujeres (50,0 años DE: 10,0).

Según grupos de edad, más de la mitad de las defunciones, 270 (61,1 % del total de fallecidos), se registraron entre los 45-59 años. En ambos sexos el mayor número de fallecimientos se produjo en el grupo de 50 a 54 años, 86 casos (25,1%) en el caso de los hombres y 28 fallecimientos (28,0%). El número de fallecimientos y las tasas por grupos de edad se muestran en la tabla 2 y figura 1.

**Tabla 2. Defunciones por VIH y sida. Número y tasas por 100.000 habitantes por sexo y grupos de edad. Año 2017**

Grupos de edad	Defunciones por VIH y sida					
	TOTAL (N)	Tasas por 100.000 hab.	HOMBRES (N)	Tasas por 100.000 hab.	MUJERES (N)	Tasas por 100.000 hab.
<=14 años	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15-19 años	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20-24 años	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25-29 años	7	0,3	6	0,5	1	0,1
30-34 años	8	0,3	6	0,4	2	0,1
35-39 años	17	0,5	8	0,4	9	0,5
40-44 años	51	1,3	33	1,6	18	0,9
45-49 años	81	2,2	63	3,3	18	1,0
50-54 años	114	3,2	86	4,8	28	1,6
55-59 años	75	2,4	63	4,0	12	0,7
60-64 años	31	1,2	24	1,8	7	0,5
65-69 años	18	0,8	18	1,6	0	0,0
70-74 años	13	0,6	11	1,1	2	0,2
75-79 años	12	0,8	12	1,8	0	0,0
80-84 años	8	0,6	6	1,0	2	0,2
>=85 años	7	0,5	6	1,2	1	0,1
<b>TOTAL</b>	<b>442</b>		<b>342</b>		<b>100</b>	

Figura 1. Tasas de mortalidad por grupos de edad, año 2017



Fuente: Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte. Instituto Nacional de Estadística

**b) Evolución de la mortalidad por VIH y sida en el periodo 1981-2017**

Entre 1981 y 2017 se han producido en España un total de 59.102 fallecimientos por VIH y sida, 80,9% en hombres y 19,1% en mujeres. El número de defunciones alcanzó su máximo en el año 1995, con 5.857 muertes. A partir de este año, los fallecimientos disminuyeron de forma muy importante hasta 1998 (descenso del 68%) y desde 1999 el descenso ha sido más lento. Con respecto al año previo, el número de fallecimientos en 2017 se redujo un 11,2 %.


Tabla 3. Defunciones por VIH y sida total y por sexos, 1981-2017

Año	Nº DEFUNCIONES VIH y SIDA		
	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
1981	4	3	1
1982	4	2	2
1983	11	9	2
1984	12	8	4
1985	69	55	14
1986	189	152	37
1987	433	348	85
1988	800	671	129
1989	1.378	1.124	254
1990	2.033	1.684	349
1991	2.657	2.241	416
1992	3.477	2.880	597
1993	4.227	3.409	818
1994	5.058	4.067	991
1995	5.857	4.741	1.116
1996	5.749	4.612	1.137
1997	3.019	2.464	555
1998	1.878	1.555	323
1999	1.844	1.517	327
2000	1.717	1.396	321
2001	1.635	1.298	337
2002	1.614	1.320	294
2003	1.635	1.292	343
2004	1.554	1.274	280
2005	1.450	1.168	282
2006	1.315	1.036	279
2007	1.313	1.064	249
2008	1.215	950	265
2009	1.079	853	226
2010	1.020	813	207
2011	953	756	197
2012	880	675	205
2013	750	604	146
2014	700	531	169
2015	633	513	120
2016	498	385	113
2017	442	342	100
<b>TOTAL</b>	<b>59.102</b>	<b>47.812</b>	<b>11.290</b>



A lo largo del periodo la tasa de mortalidad ha sido, de forma continuada, más alta en hombres que en mujeres; el pico de mortalidad se alcanzó en 1995 cuando la tasa de mortalidad global fue de 14,9 por 100.000 habitantes (24,6 en hombres y 5,6 en mujeres) (figura 2).

Figura 2. Tasas de mortalidad por VIH y sida total y por sexos, 1981-2017



Fuente: Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte. Instituto Nacional de Estadística

## CONCLUSIONES

- Las tasas de mortalidad por VIH y sida continúan con su tendencia descendente.

## BIBLIOGRAFÍA

- Secretaría del Plan Nacional sobre el sida. VIH y sida en España. Situación Epidemiológica, 2001. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 2002
- <http://www.ine.es>