

Cita previa

941 29 77 29

cita-previa.riojasalud.es

Mejor prevenir

Las actividades preventivas tienen por objeto eliminar, reducir o controlar periódicamente la fuente de infección

Los programas de vacunación contribuyen con eficacia a conseguir este objetivo y logran una protección individual, de la persona, y colectiva, de toda la sociedad.

El mantenimiento de niveles altos de coberturas de vacunación es fundamental, para evitar la reaparición de casos de enfermedades que se encuentran controladas, e incluso en algunas ocasiones en fase de eliminación o de erradicación.

Es muy importante destacar que las vacunaciones se mantienen a lo largo de toda nuestra vida, aunque la mayoría se concentran en la edad pediátrica.

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta también las recomendaciones de vacunación en los adultos, que se establecen en base a la situación epidemiológica, la edad, las vacunaciones recibidas en la infancia, la situación de salud, la ocupación, determinados estilos de vida y los viajes a otros países.



🙇 La Rioja



Calendario

Calendario de inmunización a lo largo de toda la vida 🙇 La Rioja lº Primaria 6º Primaria Mayores de Embarazo meses meses meses años años años SARAMPIÓN SARAMPIÓN VIRUS DEL **DIFTERIA** DIFTERIA DIFTERIA POLIOMIELITIS POLIOMIELITIS **POLIOMIELITIS POLIOMIELITIS PAPILOMA** DIFTERIA **DIFTERIA DIFTERIA RUBEOLA DIFTERIA TÉTANOS** TÉTANOS TÉTANOS 5 **RUBEOLA HUMANO** TÉTANOS TÉTANOS TÉTANOS **PAROTIDITIS** TÉTANOS **TOSFERINA PAROTIDITIS TOSFERINA TOSFERINA TOSFERINA TOSFERINA** H. INFLUENZAE b H. INFLUENZAE b H. INFLUENZAE b VARICELA³ VARICELA VARICELA **PAUTAS PAUTAS VIRUS HERPES** HEPATITIS B **HEPATITIS B** HEPATITIS B 1 ZOSTER⁶ CORRECTORAS 4 CORRECTORAS 4 MENINGOCOCO MENINGOCOCO MENINGOCOCO **MENINGOCOCO MENINGOCOCO MENINGOCOCO ACWY ACWY ACWY** NEUMOCOCO NEUMOCOCO NEUMOCOCO NEUMOCOCO 5 **ROTAVIRUS ROTAVIRUS GRIPE ANUAL GRIPE ANUAL** VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL² **GRIPE ANUAL** ¹ En recién nacidos de madres portadoras (AgHBs positivo): primera dosis en las primeras 24 horas de vida, junto con administración de inmunoglobulina anti-HB ² Inmunización durante la temporada del Virus respiratorio sincitial en menores de 6 meses. ³ Dos dosis separadas por 8 semanas en personas que refieran no haber padecido la enfermedad y no haber sido vacunadas previamente. Una dosis, en personas vacunadas con una única dosis. ⁴ Se aplicarán pautas correctoras en función del año de nacimiento, antecedentes de vacunación o de infección pasada. ⁵ Se vacunará a los 65 años. ⁶ Se vacunará al cumplir 65 años y en personas que cumplan 80 años sin antecedentes de vacunación previa.