

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA VACUNACIÓN DE HEPATITIS B

Doy el consentimiento para recibir una dosis de vacuna de Hepatitis B comprometiéndome a seguir el protocolo de vacunación establecido, una vez recibida la siguiente información:

- **LA HEPATITIS B:** Es el riesgo de tipo infeccioso más importante para el personal sanitario. Se transmite principalmente por vía sanguínea, por ello, todo el personal sanitario que tenga contacto directo o indirecto con sangre u otros fluidos de los pacientes debe vacunarse. Si usted no se encuentra en este grupo de riesgo también puede beneficiarse de la vacunación, ya que es una medida propuesta por la OMS como universal para erradicar esta infección en el futuro. La enfermedad por este virus puede degenerar en formas crónicas graves como hepatitis crónica activa, cirrosis y cáncer hepático.
- **LA VACUNA DE LA HEPATITIS B:** se compone del antígeno de superficie de la Hepatitis B obtenido por ingeniería genética en células de levadura y adsorbida en hidróxido de aluminio.
- **PAUTA DE PRIMOVACUNACIÓN:** son 3 dosis iniciales de 1 ml, administradas a los 0 - 1 - 6 meses, con posible revacunación, si la titulación de Anti HBs alcanzada entre 1 y 2 meses tras la 3ª dosis no es efectiva. Existe una pauta acelerada de 0-1-2-12 meses para cuando se necesite una protección rápida.
- **EFFECTOS SECUNDARIOS:** Las reacciones adversas son escasas, leves y generalmente de duración breve, no más de 24-48 horas.
 - Efectos locales: de tipo enrojecimiento, dolor, induración, prurito y eritema, se produce en el 10-29% de los casos.
 - Efectos sistémicos: el 1% de los pacientes han comunicado cansancio, cefalea, fiebre de 37,8°, vértigo, náuseas, diarreas, faringitis, síntomas de vías respiratorias altas.
 - El riesgo de reacción anafiláctica es muy remoto (se estima en 1/600.000 vacunados).
- **PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:**
 - Está contraindicada en personas que hayan tenido algún problema anterior con la vacuna o sean alérgicos a las levaduras.
 - Se debe administrar con precaución en individuos trombocitopénicos, hemofílicos, y otras alteraciones hematológicas, en dichos casos está recomendado administrar la vacuna por vía subcutánea.
 - **EMBARAZO:** No está contraindicada en el embarazo, pero sólo debe administrarse cuando realmente se necesite. La lactancia materna no es una contraindicación.
 - Se puede administrar junto con otras vacunas o junto a la Gammaglobulina, en lugares de inyección diferentes.
- **EFICACIA:** En inmunocompetentes se desarrolla protección en el 90-95% de vacunados.

Nombre y apellidos:.....

D.N.I.:.....Firma vacunado:

Logroño, adede